

مرض فيروس الإيبولا (EVD)

إشراف:


أ.د./ نبيلة المراغي
وكيلة كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع
و تنمية البيئة

إعداد:

ص./ أحمد بدر الدين
معيد بقسم الأدوية و السموم
و الكيمياء الحيوية

مرض الإيبولا:

مرض فيروس الإيبولا المعروف سابقاً بإسم حمى الإيبولا النزفية وهو مرض حاد خطير يؤدي بحياة الفرد في أغلب الأحيان إن لم يُعالج، وقد ظهر المرض لأول مرة عام ١٩٧٦ في السودان وفي قرية في الكونغو تقع على مقربة من نهر إيبولا الذي اكتسب المرض اسمه منه . و قد أصبح هذا المرض مستوطن في عدة دول أشهرها جنوب السودان و الكونغو الديموقراطية و الجابون و كوت ديفوار.



أعراض مرض فيروس الإيبولا:

تتراوح فترة حضانة المرض، بين يومين و ٢١ يوماً. ولا ينقل الإنسان عدوى المرض حتى يبدي أعراضه وتتمثل في: الإصابة فجأة بحمى موهنة وآلام في العضلات وصداع والتهاب في الحلق، يتبعها تقيؤ وإسهال وظهور طفح جلدي واختلال في وظائف الكلى والكبد، والإصابة في بعض الحالات بنزيف داخلي وخارجي على حد سواء (مثل نزيف الدم من اللثة وخروج الدم في البراز).

